

Pose d'un Implant Dentaire

Intervention chirurgicale et suivi

Qu'est-ce qu'un implant dentaire ?

La pose d'un implant dentaire consiste à insérer une vis en titane dans l'os de la mâchoire, sous la gencive, pour remplacer la racine d'une dent absente. Cet implant servira de support à une future prothèse (couronne, bridge...).

L'acte se réalise dans des conditions d'asepsie strictes, sous anesthésie locale.

Les implants utilisés

Le cabinet du Dr Girard utilise des implants de deux marques reconnues :

- Straumann® (Suisse, usine à Bâle)
- Biomet 3i® (USA, usine européenne à Valence, Espagne)

Ils sont composés :

- soit de titane pur (Ticp) à 99 %
- soit d'un alliage titane-zirconium plus résistant

Le choix dépendra de votre situation clinique.

Technique chirurgicale

Selon votre cas, la pose de l'implant peut se faire :

- directement à travers la gencive, sans incision
- juste après une extraction
- ou via la réalisation d'un lambeau gingival (incision et décollement)

Durée de l'intervention :

- Implant simple : 4 minutes
- Implant(s) complexe(s) : jusqu'à plusieurs dizaines de minutes

Des points de suture résorbables peuvent être posés (3 à 5 semaines de résorption).

Fiche d'information - Couronne ou Bridge Céramique Usinée

Avant l'intervention

- Ne pas fumer pendant les 48 heures précédentes
- Manger normalement avant le rendez-vous (pas besoin d'être à jeun)

Après l'intervention

- L'effet de l'anesthésie dure encore quelques heures.
- Une douleur modérée (3-4/10) peut apparaître ensuite, soulagée par les antalgiques prescrits.
- Un oedème (gonflement) peut survenir : réaction normale, disparaît en 6 à 7 jours.
- Éviter aliments acides, pimentés, salés pendant la cicatrisation.
- Ne pas fumer pendant une semaine après la pose.
- En cas de saignement, surtout si vous prenez des anticoagulants, contactez le cabinet si cela persiste.
- Une vis de cicatrisation peut dépasser de la gencive : bien la nettoyer mais ne pas utiliser de brosse électrique à cet endroit (risque de dévissage).
- Si la vis tombe, contactez le cabinet pour la remplacer.
- En cas de symptôme imprévu ou question, contactez-nous par mail.

Échecs possibles

Échec total :

- L'implant ne s'intègre pas (mauvaise vascularisation, contamination)
- Un nouvel implant sera posé gratuitement après 6 à 8 semaines

Échecs relatifs :

- Péri-implantite : inflammation infectieuse autour de l'implant
 - Souvent liée au tabac ou à une mauvaise hygiène
 - Si elle survient dans l'année : traitement sans frais
 - Après 1 an : devis pour les soins nécessaires

Taux de perte totale : < 1 %

Échecs partiels (réparables) : ~10 % des cas

Un contrôle annuel est indispensable :

- Examen clinique

Fiche d'information - Couronne ou Bridge Céramique Usinée

- Radiographie
- Contrôle de l'état gingival

Règlement et prise en charge

- Les implants ne sont pas remboursés par la Sécurité sociale
- Une facture vous sera remise pour votre mutuelle
- Vous avez reçu un devis détaillé préalablement

Paiement à effectuer le jour de l'intervention, sauf accord écrit 7 jours avant.

Possibilité de débit différé de 20 jours par carte bancaire, sans frais.

Coordonnées du cabinet

Dr Nicolas Girard

Chirurgien-Dentiste

12, rue La Boétie - 75008 Paris

01 42 65 48 08

dr.nicolas.girard@gmail.com